

guées à folioles larges et arrondies, tandis qu'elles sont oblongues elliptiques dans les variétés précédentes. N° 711 [Vuillet]. Cercle de Bobo-Dioulasso.

Le *Scirpus pseudo-setaceus* en Espagne et au Maroc;

PAR M. J. DAVEAU.

Découvert en Portugal vers 1890¹, le *Scirpus pseudo-setaceus* a été retrouvé depuis par les auteurs de la Flore de l'Algérie², mais aucune station intermédiaire entre ces deux divisions régionales n'avait plus été signalée.

Ayant eu l'occasion de revoir les Cypéracées du riche herbier de l'Université de Montpellier, nous avons pu retrouver d'autres échantillons qui établissent, pour cette espèce, une dispersion plus étendue. C'est ainsi que l'herbier Bouchet-Doumenq nous offrit deux échantillons, l'un de Tanger élargissant ainsi l'habitat de cette plante jusqu'au Maroc, l'autre de Gibraltar, première localité connue de cette espèce en Espagne. Ces deux échantillons portent la date de 1822 et le nom de *Scirpus setaceus*. Sous le même nom, l'herbier possède un autre exemplaire recueilli par John Lange, l'un des auteurs du *Prodromus Floræ hispanicæ*, en juin 1852 « *in pratis ad Guadarrama* ».

Actuellement, la distribution géographique du *Scirpus pseudo-setaceus* se trouve donc restreinte à la partie occidentale de la région méditerranéenne, soit : l'Algérie : Tiaret sur la limite des provinces d'Oran et d'Alger; Collo (Djebel Goufi) dans la province de Constantine; — le Maroc : Tanger; — l'Espagne : massif montagneux du Guadarrama; région sud-littorale; Gibraltar; — Portugal : région du littoral Sud-Ouest; Estramadure (Bellas, près Lisbonne); Alemtejo littoral.

1. DAVEAU (J.), *Cypéracées du Portugal* in Boletim da Sociedade Brotiana, 1891, vol. IX, p. 85, tab. 1 et sépar., p. 32-33.

2. BATTANDIER et TRABUT, *Flore de l'Algérie*, Monocotylédones, p. 99.

Nous ne doutons pas qu'on arrive à retrouver d'autres localités, soit par une étude plus attentive des échantillons d'herbier (*Scirpus setaceus* et *S. Savii* de localités espagnoles) soit par des recherches dans les stations où ils peuvent croître en communauté, comme c'est précisément le cas en Portugal.

A cet effet, nous rappellerons les principaux caractères du *Scirpus pseudo-setaceus* et ceux qui le distinguent des *S. Savii* et *S. setaceus*; dont il a le facies et avec lesquels il a pu et peut être facilement confondu.

Achènes *obscurément* trigones à angles obtus et à faces convexes :

Achènes finement ponctuées, bractée ordinairement plus courte que les épillets ou les égalant.....

S. Savii Seb. et Maur.

Achènes profondément sillonnés en long, bractée ordinairement plus longue que les épillets.....

S. setaceus L.

Achènes *nettement* triquètres à angles saillants et à faces concaves finement ponctuées. Tiges filiformes très grêles, bractée ordinairement plus longues que les épillets, ceux-ci offrant des écailles fortement concaves, bossues....

S. pseudo-setaceus.

Ces caractères permettront de distinguer facilement notre espèce de ses deux congénères.